

病名	初期症状	感染しやすい期間	登園の目安
麻疹 (はしか)	高熱、特有の発疹、くしゃみ	発症1日前から発症後4日後まで	解熱した後3日経過するまで
風疹 (三日ばしか)	ばら紅色の発疹	発疹前7日～後7日間	発疹が消失するまで
水痘 (水ぼうそう)	紅班、丘疹、水泡 膿水泡、痂皮(かさぶた)	発疹1～2日まえから痂皮形成まで	すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発熱、耳の下がはれる	発症3日前～耳下腺腫張後4日	耳下腺の腫れが出現後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
インフルエンザ	急な発熱、頭痛、咽頭痛、嘔吐、気道炎症状	発症前24時間～発症後3日程度	発症翌日から5日を経過し、かつ解熱して72時間経過し全身状態が良好なとき
コロナウイルス	発熱、鼻水、喉の痛み、咳、臭覚異常、味覚異常	発症前から発症後5～10日	発症翌日から5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳	独特な咳	咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、咽頭炎、結膜炎	すべての症状が消失してから2日間	主要症状が消えて2日経過するまで
ヘルパンギーナ	発熱、口腔内水泡	急性期の数日間	下痢、嘔吐の症状が消失し医師が登園を許可したとき
感染性胃腸炎 ノロウイルス	発熱、腹痛、下痢	症状のある期間と症状消失後1週間	下痢、嘔吐の症状が消失し普段の食事がとれること
溶連菌感染症	発熱、咽頭炎、扁桃腺炎、 舌、全身に発疹	2～4日	有効治療を始めてから2～3日たって
RSウイルス	咳	呼吸器症状のある間	重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと
手足口病	水疱性の発疹が口、手、足に現れる、	発症前3～6日	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段の食事ができること
帯状疱疹	小水疱が神経の支配領域にそった形で片側性に現れる。	不定	すべての発疹がかさぶたになるまで

2012年改訂版保育所における感染症対策ガイドラインより抜粋

【感染症の登園基準】

主治医の診断を受けてから登園してください。